

## Prüfungsfragen Heilpraktiker Psychotherapie Oktober 2013

### 1

#### Einfachauswahl

Menschen, die Ihre Angelegenheiten aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht mehr selbst regeln können, benötigen in vielen Fällen eine rechtliche Betreuung.

Bei welcher Erkrankung ist im langfristigen Verlauf am ehesten die Errichtung einer rechtlichen Betreuung erforderlich?

- A) Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- B) senile Demenz
- C) Asperger-Syndrom
- D) anankastische (zwanghafte) Persönlichkeitsstörung
- E) Somatisierungsstörung

### 2

#### Einfachauswahl

Welche Aussage zur Manie trifft zu?

- A) Psychotherapie steht im Vordergrund der Behandlung
- B) Die Patienten erkranken in der Regel erst im Alter über 60 Jahre
- C) Es besteht ein erhöhtes Schlafbedürfnis
- D) Psychotische Symptome sind mit der Diagnose einer Manie vereinbar
- E) Größenideen kommen bei der Manie nicht vor.

### 3

#### Aussagenkombination

Welche der folgenden Symptome gehören typischerweise zur Korsakow-Psychose (Organisches amnestisches Syndrom)?

1. Ataxie
  2. Desorientierung
  3. Konfabulation
  4. Bewusstseinsstörungen
  5. Gedächtnisstörungen
- A) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - E) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

**4**

**Einfachauswahl**

Welches Kriterium ist kennzeichnend für die psychotische Störung Alkoholhalluzinose?

- A) Bewusstseinsstörungen
- B) Auftreten im Alkoholentzug
- C) Akustische Halluzinationen
- D) extreme Bewegungsunruhe
- E) taktile Halluzinationen

**5**

**Mehrfachauswahl**

Ein zwanzigjähriger Mann kommt in Begleitung seiner Eltern zu Ihnen. Sie denken aufgrund der Angaben der Eltern und des auffallenden Verhaltens während des Gespräches an eine hebephrene Schizophrenie.

Auf welche Befunde oder anamnestischen Angaben stützen Sie Ihren Verdacht?

Wählen Sie zwei Antworten.

- A) leichtgradige Intelligenzminderung
- B) Beginn der Auffälligkeiten bei der Einschulung
- C) flache, unpassende Stimmung
- D) zunehmende Antriebsminderung
- E) seit einem Monat anhaltende gedrückte Stimmung

**6**

**Einfachauswahl**

Wie lange müssen die Symptome bei einer Dysthymia bei einer Diagnosestellung (nach ICD 10) mindestens bestehen?

- A) ein Monat
- B) sechs Monate
- C) ein Jahr
- D) zwei Jahre
- E) fünf Jahre

**7**

**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Symptome sind bei der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) häufig zu beobachten?

1. Nachhallerinnerungen
  2. Vermeidungsverhalten
  3. Emotionale Abgestumpftheit
  4. vegetative Übererregtheit
  5. sozialer Rückzug
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle sind richtig

**8**

**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zu Zwangsstörungen treffen zu?

1. Zwangsstörungen können zu sozialer Isolierung führen
  2. Zwangsgedanken werden vom Betroffenen meist als sinnlos erlebt
  3. Beim Versuch, Zwangshandlungen zu unterlassen treten innere Anspannung und Angst auf
  4. Antidepressiva können die Symptome einer Zwangsstörung bessern
  5. Zwangsimpulse sind gefährlich, da es hierdurch häufig zu Verletzungen kommt
- A) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle sind richtig

**9**

**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Behandlung mit kognitiver Verhaltenstherapie ist eine Therapieoption
- B) Die Krankheit kommt bei erwachsenen so gut wie nie vor
- C) Bei der medikamentösen Therapie werden Psychostimulantien eingesetzt
- D) Die Krankheit ist bei Mädchen deutlich häufiger als bei Jungen
- E) In Deutschland sind mehr als 30 % aller Kinder und Jugendlichen davon betroffen

**10**

**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) für die bipolare affektive Störung (manisch-depressive Krankheit) nach ICD 10 zu?

1. Manische Episoden dauern in der Regel zwischen zwei Wochen und vier bis fünf Monaten
  2. Charakteristisch bei der bipolaren affektiven Erkrankung ist eine weitgehende bis vollständige Besserung zwischen den Episoden
  3. Von der Erkrankung sind weit überwiegend Männer betroffen
  4. Manische Episoden beginnen in der Regel abrupt (rasch, innerhalb weniger Tage)
  5. Depressive Phasen der bipolaren Störung tendieren zu längerer Dauer als manische Phasen, selten allerdings länger als ein Jahr
- 
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig
  - B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
  - E) Alle sind richtig

**11**

**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zum Suizid treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Ein Suizidversuch ist nach deutschem Recht als Straftat einzustufen
- B) Zur Verhinderung einer suizidalen Handlung können Zwangsmaßnahmen erforderlich werden
- C) Die Suizidalität sollte bei dem entsprechenden Verdacht offen angesprochen werden
- D) Psychische Erkrankungen stellen ein gering erhöhtes Risiko für eine suizidale Handlung dar
- E) Suizide werden in den seltensten Fällen angekündigt

**12**

**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zum Morbus Parkinson trifft (treffen) zu?

1. Das Krankheitsbild kann mit einer depressiven Symptomatik verwechselt werden
  2. Bei Parkinson-Erkrankungen entwickelt sich sehr selten eine Demenz
  3. Beim Gangbild sind große Schritte und ein lebhaftes Mitschwingen der Arme typisch
  4. eine Parkinson-Symptomatik kann durch Psychopharmaka ausgelöst werden
  5. Psychotherapeutische Verfahren haben vor allem bei psychischen Begleitsymptomen eine Bedeutung
- 
- A) Nur die Aussage 3 ist richtig
  - B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

**13**

**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Störungen gehören zu den formalen Denkstörungen?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Denkverlangsamung
- B) Überwertige Ideen
- C) Verarmungswahn
- D) Ideenflucht
- E) Hypochondrischer Wahn

**14**

**Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Bei der erstmalig auftretenden paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie

- A) ist die Klarheit des Bewusstseins beeinträchtigt
- B) sind die intellektuellen Fähigkeiten akut herabgesetzt
- C) ist der Betroffene oftmals überzeugt, seine innersten Gedanken seien anderen bekannt
- D) herrschen Schuldgefühle vor
- E) sind Selbstverletzungen typisch

**15**

**Einfachauswahl**

Welche Aussage zum Autogenen Training trifft zu?

- A) Das Verfahren ist durch willentliche und bewusste An- und Entspannung von Muskelgruppen charakterisiert.
- B) Ziel ist ein Entspannungszustand mit möglichst geringer Abhängigkeit vom anleitenden Therapeuten
- C) Ziel ist eine konzentrierte Amnesie
- D) Bei akut psychotischen Patienten wirkt es sich günstig auf die Gespanntheit aus
- E) Das Autogene Training ist die Methode der Wahl zum Abbau von Zwangshandlungen

**16**

**Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu? Bei der Agoraphobie hat sich folgendes psychotherapieverfahren am wirksamsten erwiesen:

- A) die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Biografiearbeit)
- B) die klientenzentrierte Psychotherapie nach Rogers
- C) die Verhaltenstherapie (systematische Desensibilisierung, Flooding)
- D) die Gestalttherapie (Psychodrama)
- E) die dialektisch-behaviorale Therapie nach Linehan (Skoll-Training)

**17**

**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur zwangsweisen Unterbringung eines psychisch Kranken treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Ein zur Ausübung der Psychotherapie berechtigter Heilpraktiker kann eine Unterbringung seines psychisch kranken Patienten anordnen
- B) Eine mehrwöchige Unterbringung bedarf eines Gerichtsbeschlusses
- C) Die Unterbringung eines psychisch Kranken kann nur in Kliniken für forensische Psychiatrie erfolgen
- D) Bei zwangsweiser Unterbringung werden die psychisch Kranken in der Regel für mehrere Tage am Bett fixiert
- E) Unterbringungsbedürftig sind psychisch Kranke, die krankheitsbedingt sich selbst oder andere erheblich gefährden, wenn die Gefahr nicht auf anderem Wege abgewendet werden kann

**18**

**Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Bei einem 17jährigen Gymnasiasten verschlechtern sich die Schulleistungen zusehends. Er vernachlässigt seine bisherigen Interessen und Hobbys. Oftmals fallen gerötete Augen auf. Sie vermuten als Ursache am ehesten:

- A) eine Persönlichkeitsstörung
- B) akustische Halluzinationen
- C) eine Angststörung mit Vermeidungsverhalten
- D) chronischen Cannabiskonsum
- E) eine autistische Störung

**19**

**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur primären Enuresis treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Nach bereits erworbener Blasenkontrolle über sechs Monate tritt wieder Einnässen auf.
- B) Familiäre Häufung wird nur selten beobachtet
- C) Primäre Enuresis ist definiert als unwillkürliches Einnässen ohne somatischen Befund über das fünfte Lebensjahr hinaus
- D) Der Verlauf zeigt eine hohe Spontanheilungsrate
- E) Am häufigsten tritt sie tagsüber auf (Enuresis diurna)

**20**

**Einfachauswahl**

Welche der genannten Auffälligkeiten ist bei einer chronischen Schizophrenie am häufigsten anzutreffen?

- A) Drohungen oder Gewalttätigkeiten
- B) gesellschaftlich peinliches Verhalten
- C) sozialer Rückzug
- D) Depression
- E) vermehrte Aktivität

**21**

**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zum Delir treffen zu?

1. Bei einem Delir liegt ein akuter, oft vital bedrohlicher Zustand vor
  2. Ein typisches Symptom ist eine komatöse Bewusstseinslage
  3. Typisch sind Desorientiertheit, optische Sinnestäuschungen und Situationsverkennung
  4. Delirien treten nur bei Suchtkrankheiten auf
  5. Ein Delir sollte stationär behandelt werden
- 
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 2, 2 und 5 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

**22**

**Einfachauswahl**

Eine 45jährige Frau mit der Diagnose einer akuten Belastungsreaktion kommt zu Ihnen mit dem Wunsch, das Autogene Training zu erlernen.

Im Rahmen der Anamneseerhebung schildert sie Ihnen, heute Morgen sei sie sogar dermaßen im Stress gewesen, dass ihr für einige Minuten schwarz auf dem rechten Auge geworden und ihr beim Abspülen ein Teller aus der Hand gefallen sei.

Welche Maßnahme ist hier vordringlich erforderlich?

- A) die Erhebung der vollständigen sozio-biographischen Anamnese
- B) Psychoedukation zu den theoretischen Konzepten von Stress und Burnout
- C) Beginn der Einübung des Autogenen Trainings mit der Vermittlung der Schwereübung
- D) die Herstellung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung
- E) fachärztliche Abklärung



**23**

**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zu Angststörungen treffen zu?

1. Agoraphobie kommt häufig kombiniert mit einer Panikstörung vor
  2. Die Symptome der sozialen Phobie können sich bis zur Panikattacke steigern
  3. Das wesentliche Kennzeichen der Panikstörung sind wiederkehrende schwere Angstattacken, die sich auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränken
  4. Die wesentlichen Symptome der generalisierten Angststörung sind variabel. Beschwerden wie ständige Nervosität, Zittern, Schwitzen oder Oberbauchbeschwerden gehören zu diesem Bild.
  5. Schlüsselsymptom bei der Agoraphobie ist das Auftreten von Angst bei Fehlen einer sofortigen Fluchtmöglichkeit
- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

**24**

**Einfachauswahl**

Welche Aussage zu frühkindlichem Autismus trifft zu?

- A) Bei autistischen Kindern beeindruckt zunächst die ausgeprägte Emotionalität
- B) Autistische Kinder schließen im Intelligenztest besonders gut in den Subtests für sprachliche Fähigkeiten ab
- C) Häufig wird die Störung beim Besuch der Schule aufgedeckt und äußert sich schon in den ersten Unterrichtswochen durch fehlenden sozialen Kontakt
- D) Zum Aufbau von positiven oder normalen Fertigkeiten wie Blickkontakt und Sprachbenutzung werden besonders häufig operante Methoden eingesetzt
- E) Repetitives und autoaggressives Verhalten kommen selten vor

**25**

**Einfachauswahl**

Was versteht man unter Pavor nocturnus?

- A) gehäuft auftretende nächtliche Alpträume mit detaillierter Erinnerung an die erschreckenden Traum inhalte
- B) Schlafwandeln
- C) eine Form der Hypersomnie, die häufig bei depressiven Störungen auftritt
- D) nächtliche Episoden äußerster Furcht und Panik mit heftigem Schreien, Bewegungen und autonomer Erregung
- E) eine besonders bei Frauen und älteren Menschen auftretende erhöhte Angst vor Schlaflosigkeit

**26**

**Einfachauswahl**

Welche Aussage zur schizoiden Persönlichkeitsstörung trifft zu?

- A) übertriebene Empfindlichkeit bei Rückschlägen und Zurücksetzung
- B) übermäßige Vorliebe für einzelgängerische Beschäftigung
- C) sehr geringe Frustrationstoleranz und niedrige Schwelle für aggressives, auch gewalttätiges Verhalten
- D) streitsüchtiges und beharrliches, situationsunangemessenes Bestehen auf eigenen Rechten
- E) Übermäßige Pedanterie und Befolgen von Konventionen

**27**

**Mehrfachauswahl**

Welche Symptome sind typische Merkmale des somatischen Syndroms im Rahmen einer depressiven Episode?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) anhaltende Kopfschmerzen
- B) Gewichtszunahme
- C) deutlicher Libidoverlust
- D) häufiges Wasserlassen
- E) Morgentief

**28**

**Mehrfachauswahl**

Bei einem Ihrer Patienten besteht eine Herzneurose (somatoforme autonome Funktionsstörung).

Welche der folgenden Informationen/Empfehlungen geben Sie dem Patienten?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Eine Herzneurose führt zu organischen Veränderungen am Herzen
- B) Die regelmäßige Einnahme von Benzodiazepinen ist unbedenklich
- C) Es sollte häufig ein Elektrokardiogramm (EKG) angefertigt werden
- D) Bei subjektivem Leidensdruck ist eine Psychotherapie sinnvoll
- E) Bei gleichzeitiger depressiver Verstimmung ist die Einnahme eines Antidepressivums eventuell sinnvoll

**Antworten:**

<b>1</b>	B	<b>8</b>	D	<b>15</b>	B	<b>22</b>	E
<b>2</b>	D	<b>9</b>	A C	<b>16</b>	C	<b>23</b>	D
<b>3</b>	E	<b>10</b>	D	<b>17</b>	B E	<b>24</b>	D
<b>4</b>	C	<b>11</b>	B C	<b>18</b>	D	<b>25</b>	D
<b>5</b>	C D	<b>12</b>	D	<b>19</b>	C D	<b>26</b>	B
<b>6</b>	D	<b>13</b>	A D	<b>20</b>	C	<b>27</b>	C E
<b>7</b>	E	<b>14</b>	C	<b>21</b>	B	<b>28</b>	D E